

# TRICHINELOZA

## TRICHINELOZA poate fi prevenită!

De obicei:

- Omul se îmbolnăvește consumând carne infestată cu trichinela.
- Porcul se infestază cu trichinelă consumând cadavrele de șobolani morți.

De aceea:

- Efectuați deratizări în gospodării, folosind capcane, momeli otrăvite, etc.
- Supravegheați ca porcii din gospodăria dv. să nu mănânce cadavrele diferitelor animale moarte sau resturile rezultate din sacrificarea altor porci.
- **ORICE PORC SACRIFICAT TREBUIE SUPUS CONTROLULUI VETERINAR, CONTROLULUI TRICHINOSCOPIC AL CĂRNII DE PORC CARE ESTE OBLIGATORIU!**

### **CRESCĂTORI DE ANIMALE!**

**CEREȚI MEDICILOR VETERINARI SĂ VĂ CONTROLEZE ANIMALELE PENTRU TRICHINELOZĂ!**

**NUMAI CARNEA CONTROLATĂ POATE FI VÂNDUTĂ LEGAL, ASIGURÂNDU-VĂ UN PROFIT PE MĂSURĂ ȘI SĂNĂTATEA CONSUMATORULUI!**

- Pentru o mai deplină siguranță, carnea de porc, de mistreț sau de urs înainte de a fi consumată, va fi întotdeauna bine fiartă sau friptă (30 min.)

**ATENȚIE:** - Bolnavii de trichineloză nu sunt contagioși.

- Persoanele care au consumat aceleași produse de carne cu bolnavul vor fi considerate suspecte și pot fi controlate prin analize de laborator.

- Primele semne de boală sunt: **FEBRĂ până la 39°-40°C, GREȚURI, VĂRSĂTURI, DIAREE, DURERI ABDOMINALE.**

Prezentați-vă imediat la medic pentru stabilirea diagnosticului.

- Ulterior pot apărea: **UMFLAREA FEȚEI ȘI A PLEOAPELOR, DURERI MUSCULARE REUMATOIDE, FEBRĂ 40°-41°C, TRANSPIRAȚII, DURERILE DE CAP, GREUTATE LA MESTECAT, ÎNGHIȚIT ȘI RESPIRAT.**

**PUTEȚI EVITA TRICHINELOZA RESPECTÂND INSTRUCȚIUNILE DATE!**

**DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ  
-BOTOȘANI-**